



معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز

تعاریف اپیدمیولوژیک بیماری های مشمول گزارش فوری (تلفنی)

در صورتی که علائم بیماری افراد با تعاریف ذیل منطبق باشد لازم است در عرض 24 ساعت به صورت تلفنی با مشخصات و آدرس کامل به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود.

فلج شل حاد	وقوع هر نوع فلج شل ناگهانی در اندام ها (بدون سابقه ضربه) در افراد زیر 15 سال
سرخک	هر شخصی که طبق نظر پزشک از لحاظ بالینی به عفونت سرخک مشکوک باشد یا هر شخص دارای نشانه های تب و راش (بثورات) ماکولوپاپولر (غیر وزیکولر)
سرخجه	هر بیمار با تب و راش ماکولوپاپولر همراه با یک یا چند تا از این علائم: آدنوپاتی در گردن، پس سر یا پشت گوش ، درد یا تورم مفاصل
سندرم سرخجه مادرزادی	1. هر کودک کمتر از یک سال که کارمندان بهداشتی در او مشکوک به CRS شوند. 2. هر کودک کمتر از یک سال دارای تاریخچه مادری مشکوک یا تایید شده ابتلا به سرخجه در دوران حاملگی 3. هر نوزادی با بیماری قلبی و یا مشکوک به کری و یا با یک یا چند علامت از علائم چشمی: مردمک سفید (کاتاراکت)، کاهش دید، حرکات پاندولی چشم (نیستایوس)، لوچی، کره چشم کوچک (میکروفتالموس)، قرنیه بزرگتر (گلوکوم مادرزادی)
دیفتری	بیمار دارای غشای چسبنده در لوزه، حلق یا بینی و متعاقب آن هر یک از موارد لارنژیت، فارنژیت و یا تونسیلیت
کزاز نوزادان	مرگ نوزاد در سن 3 تا 28 روز که علت مرگ مشخص نباشد یا هر نوزادی که بعثت کزاز نوزادی فوت نموده و مورد بررسی قرار نگرفته است یا نوزادی که 2 روز اول به طور طبیعی قادر به مکیدن پستان و گریستن باشد و بین روزهای 3 تا 28 دچار عدم توانایی مکیدن شیر شده و به دنبال آن دچار سفتی و اسپاسم عضلات شود.
مننژیت	شروع ناگهانی تب بالای 38.5 درجه سانتی گراد رکتال یا 38 درجه زیر بغل داشته و یکی از علائم سفتی گردن، کاهش سطح هوشیاری، علائم مننژیال (سردرد ، استفراغ و هر نوع عارضه نورولوژیک ناگهانی) فونتانل برجسته (در اطفال)
عوارض ایمنسازی	هر پیامد نامطلوبی که متعاقب ایمنسازی بوجود آمده و عقیده بر آن است که علت آن واکنش های سیستم ایمنی است (موارد مرگ، بستری در بیمارستان، آبرسه و هر عارضه ای که باعث تشویش اذهان عمومی شود)
وبا (التور)	هر فرد بالای 2 سال که در اثر اسهال حاد آبکی دچار کم آبی شدید شود یا به علت اسهال آبکی بمیرد.
بوتولیسم	شروع ناگهانی فلج شل پایین رونده قرینه همراه با ضعف عمومی، پتوز پلک، دو بینی Diplopia، تاری دید، خشکی دهان، دیس فازی، دیس فونیا، دیس آرتریا، نداشتن تب (در صورت نداشتن عفونت ثانویه)، تهوع و استفراغ و دیلاتاسیون مردمک چشم
طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا	استفاده دو نفر یا بیشتر از یک غذا یا آشامیدنی مشترک و بروز علائم مشابه
مالاریا	تب های متناوب همراه با حمله دوره ای یا سابقه مسافرت به مناطق آلوده
سیاه زخم تنفسی	وجود علائم کلینیکی سازگار با سیاه زخم تنفسی (شروع علائم ریوی) همراه با ارتباط اپیدمیولوژیک با موارد حیوانی مشکوک یا قطعی مبتلا به سیاه زخم یا محصولات آلوده دامی
حیوان گزیدگی	شخصی که از طریق بزاق، گزش یا خراش یک حیوان حساس به هاری یا حیوانی از منطقه آلوده به هاری مورد مواجهه قرار گرفته است
سایر بیماری های گزارش فوری	سل ریوی اسمیر مثبت ، بیماری های بثوری خونریزی دهنده C.G.H.F ، طاعون، تیفوس، تب زرد، کم کاری تیروئید نوزادان، فنیل کتونوری، آنفلوآنزای پرندگان، سیاه سرفه، فاسیولا، شیش تن، سارس و هرگونه افزایش ناگهانی کلیه بیماری ها

بیماری های مشمول گزارش غیر فوری: (به صورت هفتگی یا ماهیانه به مراکز بهداشتی درمانی یا مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود)

سایر انواع سل (سل ریوی اسمیر منفی و سل خارج ریوی) - جذام - ایدز و موارد مثبت HIV - بیماری های آمیزشی - انواع هپاتیت های ویرال A - B - C - E - D - کیست هیداتیک - کزاز بالغین تیفوئید - پدیکولوز - گال - شیگلوز - سیاه زخم جلدی - کالآزار - تب مالت - سالک - لپتوسپیروز - عفونت های بیمارستانی - سایر عوارض ایمن سازی.